



Poliklinika Medikol

OPIS TERAPIJSKOG POSTUPKA: LASERSKA EPILACIJA

UP-45/2

OPIS i SVRHA POSTUPKA

Vrsta lasera: Nd:YAG 1064 nm

Laserska epilacija je postupak kojim se postiže trajna redukcija dlakovosti.

Tretman je isključivo vezan za dlaku u aktivnoj fazi rasta /anagenoj fazi/. Stoga je malo vjerojatno da će destrukcija svih folikula dlaka nastati nakon jednog tretmana te je važno naglasiti da će za značajnu i dugoročnu redukciju dlakovosti biti potrebno više tretmana.

Ovim postupkom moguće je tretirati jedino dlačice tamne boje, dok je učinak zanemariv za dlaku bijele, sive i crvene boje. Genetički i hormonski utjecaji dodatni su faktori koji utječu na dlakovost, a što u konačnici može utjecati i na rezultat tretmana.

Prije tretmana potrebno je informirati liječnika o kroničnim bolestima, lijekovima koje uzimate te ako imate česte infekcije herpes virusom (Herpex simplex ili Herpes zoster).

Potrebno je navesti ako imate teže kronične bolesti ili ako steližečeni zbog karcinoma kože ili melanoma. Pacijentima koji imaju vitiligo mogu se nakon laserskog tretmana pojaviti nova žarišta vitiliga.

Nakon pripreme kože koja uključuje čišćenje kože te brijanje dlačica, aplicira se gel, a oči zaštite naočalama.

Za žene reproduktivne dobi: potpisivanjem suglasnosti prihvataćete tretman laserske epilacije i potvrđujete da niste trudni. Također se obvezujete da ćete obavijestiti liječnika ako zatrudnите u periodu između tretmana.

Fotodokumentacija može biti učinjena prije tretmana, na kontrolnom pregledu te nakon tretmana.

Pristajem na fotografiranje: da ne

Pristajem na korištenje mojih fotografija za nastavne svrhe: da ne

NUSPOJAVE (POPRAVNE POJAVE)

Moguće su tijekom i nakon tretmana te se opisuju kao:

NELAGODA - različiti oblici nelagode mogući su tijekom tretmana, kao što su osjećaj peckanja, žarenja, bockanja i umjerene boli,

CRVENILO/OTEKLINE - moguće su pojave crvenila (eritema) i otekline (edemi) tretiranog područja, koji su prolazni.

PROMJENE PIGMENTACIJE - moguća je pojava hipo ili hiperpigmentacija tretirane kože (tretirana koža je u odnosu na okolnu netretiranu svjetlijia ili tamnija) - *ovakve promjene su obično prolazne, iako kod nekih pacijenata mogu biti i trajne.*

RANE - moguća je pojava mjehurića u području tretirane kože nakon čije rupture nastaju plitke erozije, ranice ili krastice. Ako primijetite jednu od ovih promjena odmah nas kontaktirajte.

INFEKCIJE - infekcija je moguća u slučaju ranica (erozija) na tretiranoj koži. Ranicu je potrebno zaštititi antibiotskom masti i povojem (flaster). Primijetite li znakove infekcije, kao što su crvenilo, bol i oteklina, odmah nas kontaktirajte.

OŽILJCI - pojava ožiljaka je rijetka pojava, ali je moguća. Kako bi umanjili rizik nastanka ovih promjena važno je pridržavati se uputa o njezi kože nakon tretmana.

OŠTEĆENJA VIDA - tijekom cijelog tretmana oči će biti zaštićene naočalama, kako bi izbjegli mogućnost njihovog oštećenja laserom.

NJEGA NAKON TRETMANA

Nakon tretmana ne preporučuje se izlaganje suncu. Kremu za zaštitu od sunca (SPF 50, UVA+UVB) potrebno je aplicirati ako je tretiran dio kože koji je izložen suncu.

Neutralnu kremu za lice, aloa vera gel ili losion za tijelo preporučuje se primjenjivati u svakodnevnoj njezi.

U slučaju pojave mjeđurića, krastica i ranica potrebno je aplicirati mupirocin mast te se telefonom naručiti na kontrolni pregled.

Preporučujemo da se pridržavate uputa o redovnim periodičnim dolascima na tretmane, što utječe na uspješnost samog tretmana, kao i svih uputa liječnika.

Ime i prezime pacijenta: _____

Vlastoručni potpis: _____

Datum: _____