



OPIS I SVRHA POSTUPKA:

Mezoterapija je medicinski postupak kojim se postiže regeneracija kože, hidratacija i svježiji, zategnutiji izgled kože. Provodi se u više tretmana, prema određenom protokolu.

Prije samog tretmana potrebno je navesti koje lijekove uzimate, imate li teže kronične bolesti, autoimune bolesti, duševne ili neurološke bolesti, sarkoidozu te alergijske reakcije na lijekove, kreme i preparate koje ste primjenjivali u estetske svrhe. Ako imate recidivirajuće infekcije s herpes virusom (Herpes simplex ili Herpes zoster), isto je potrebno navesti liječniku koji će potom odlučiti hoće li Vam preventivno indicirati lijek Aciklovir.

Za žene reproduktivne dobi: potpisivanjem suglasnosti prihvaćate tretman i potvrđujete da niste trudni. Također se obvezujete da ćete obavijestiti liječnika ako zatrudnите u periodu između tretmana.

Fotodokumentacija može biti učinjena prije tretmana, na kontrolnom pregledu te nakon tretmana.

Pristajem na fotografiranje: da ne

Pristajem na korištenje mojih fotografija za nastavne svrhe: da ne

Nakon pripreme kože koja uključuje čišćenje i dezinfekciju kože, započinje se tretman.

NUSPOJAVE (POPRATNE POJAVE)

Moguće su tijekom i nakon tretmana.

Uobičajene reakcije na mjestu primjene uključuju crvenilo, oticanje, bol, svrbež, podljeve, promjenu boje kože i osjetljivost na mjestu injiciranja. Općenito, ove reakcije opisane su kao blage do umjerene i tipično dolazi do njihova spontanog povlačenja unutar nekoliko sati.

Rjeđe, moguće popratne pojave uključuju infekcije i kontaktni alergijski dermatitis. U slučaju pojave simptoma u obliku produženog trajanja crvenila, mjejhura, otekline i ljuskanja, odmah se javite na kontrolni pregled.

NJEGA NAKON TRETMANA

Nakon tretmana ne preporučuje se izlaganje ekstremno visokim i niskim temperaturama, masaže lica, kao i istovremeno i drugi estetski tretmani, a da se u međuvremenu niste konzultirali s liječnikom.

Kod kuće možete aplicirati neutralnu kremu za lice te kremu za zaštitu od sunca sa SPF 50.

U slučaju pojave mjejhurića, krastica, ranica ili izrazitog crvenila, potrebno je aplicirati Mupirocin mast te se telefonom najaviti za kontrolni pregled. Kontrole nakon tretmana se ne naplaćuju. Na moguće podljeve (hematome) možete aplicirati Heparin gel.

Preporučujemo da se pridržavate uputa, što utječe na uspješnost samog tretmana te praćenje pacijenta u slučaju pojave mogućih popratnih pojava.

Ime i prezime pacijenta: _____

Vlastoručni potpis: _____

Datum: _____