



OPIS I SVRHA POSTUPKA

PROFHILO je medicinski proizvod za intradermalnu primjenu koji djeluje korektivno na prirodne i inducirane kožne promjene, intervenirajući:

- U fiziološkom procesu starenja kože na procese koji uključuju smanjenje hidratacije kože, promjene elastičnih vlakana i kolagena s gubitkom napetosti (turgora) kože
- U dermalnom procesu obnavljanja tkiva, u slučaju ožiljaka koji su rezultat površinske kožne traume (akne, vodene kozice).

Prije samog tretmana potrebno je navesti koje lijekove uzimate, imate li teže kronične bolesti, autoimune bolesti, duševne ili neurološke bolesti, sarkoidozu te alergijske reakcije na lijekove, kreme i preparate koje ste primjenjivali u estetske svrhe. Ako imate recidivirajuće infekcije s herpes virusom (Herpes simplex ili Herpes zoster), isto je potrebno navesti liječniku koji će potom odlučiti hoće li Vam preventivno preporučiti lijek Aciklovir.

Za žene reproduktivne dobi: potpisivanjem suglasnosti prihvaćate tretman i potvrđujete da niste trudni. Također se obvezujete da ćete obavijestiti liječnika ako zatrudnite u periodu između tretmana.

Fotodokumentacija može biti učinjena prije tretmana, na kontrolnom pregledu te nakon tretmana.

Pristajem na fotografiranje: da ne

Pristajem na korištenje mojih fotografija za nastavne svrhe: da ne

Nakon pripreme kože koja uključuje čišćenje i dezinfekciju kože, započinje s tretmanom.

NUSPOJAVE (POPRAVNE POJAVE)

Moguće su tijekom i nakon tretmana. Uobičajene reakcije na mjestu primjene uključuju crvenilo, oticanje, bol, svrbež, podljeve, promjenu boje kože i osjetljivost na mjestu injiciranja. Općenito, ove reakcije opisane su kao blage do umjerene i tipično dolazi do spontanog povlačenja nekoliko dana nakon injiciranja. Druge vrste reakcije su rijetke (alergijske reakcije, granulomi, nekroza, infekcija, ožiljci, promjene boje kože).

Liječnik me također obavijestio da rezultat tretmana proizvodom iz linije PROFHILO, ovisno o području primjene, tipu i izgledu kože te životnoj dobi, mogu potrajati od 9 do 12 mjeseci, a u nekim slučajevima njihovo trajanje može biti i kraće ili dulje. Naknadne korekcije i dodatni tretmani pomažu održati željeni stupanj korekcije. Kod nekih pacijenata je potreban veći broj tretmana.

NJEGA NAKON TRETMANA

Nakon tretmana ne preporučuje se izlaganje ekstremno visokim i niskim temperaturama, masaže lica te se ne preporučuju istovremeno i drugi estetski tretmani, a da se u međuvremenu niste konzultirali s liječnikom.

Kod kuće možete aplicirati neutralnu kremu za lice te kremu za zaštitu od sunca sa SPF 50.

U slučaju pojave mjehurića, krastica, ranica ili izrazitog crvenila, potrebno je aplicirati Mupirocin mast te se odmah telefonom najaviti za kontrolni pregled.

Na moguće podljeve (hematome) možete aplicirati Heparin gel.

Preporučujemo da se pridržavate uputa, što utječe na uspješnost samog tretmana te praćenje pacijenta u slučaju pojave mogućih popratnih pojava.

Ime i prezime pacijenta: _____

Vlastoručni potpis: _____

Datum: _____