



Poliklinika Medikol

INFORMACIJE I UPUTE PACIJENTIMA O MSCT KOLONOGRAFIJI

UP-98/0

MSCT kolonografija / 3D virtualna kolonoskopija

Kompjuterizirana tomografska kolonografija (MSCT kolonografija) poznatija kao 3D virtualna kolonoskopija neinvazivna je pretraga, alternativa klasičnoj kolonoskopiji. Kombinacijom napredne CT tehnologije i sofistificiranog softvera virtualna kolonoskopija stvara 3D prikaz debelog crijeva. Ta procedura je brža, lakša i ugodnija za pacijenta od klasične kolonoskopije.

Za mnoge paciente ona predstavlja metodu izbora za detekciju bolesti debelog crijeva uključujući polipe, divertikule kao i karcinome debelog crijeva. Brojne studije su potvrdile da virtualna kolonoskopija može detektirati >90 posto polipa veličinom >=10mm, odnosno u istom postotku kao i klasična kolonoskopija.

Priprema za MSCT kolonografiju/ 3D virtualnu kolonoskopiju

Za ovu pretragu potrebno je promijeniti prehranu i piti propisano kontrastno sredstvo u određeno vrijeme.

Treći i drugi dan prije pretrage izbjegavati u potpunosti voće i povrće. Preostale namirnice nisu zabranjene.

DAN PRIJE PRETRAGE:	NA DAN PRETRAGE:
TEKUĆA PREHRANA Npr. voda, limunada, ionska pića i energetska pića za sportaše, čaj, kava (bez kofeina), juha, sok bez pulpe (npr. jabučni). Najbolje bi bilo uzimati samo čistu juhu bez dodataka (bez tjestenine i sl.)	Ujutro možete uzeti sve lijekove i popiti malu količinu vode ili čaja.
Lijekovi se mogu uzimati bez ograničenja.	Prije dolaska na dogovoren termin, u cijelosti obavite svoje fiziološke potrebe ili u cijelosti ispraznite crijeva
PRIPREMA ZA PRETRAGU Prije početka pripreme poželjno je područje oko rektuma tretirati mašću: (mast s deksapantenolom, vazelin i dr.) kako bi se izbjegla bolnost tijekom čestih odlazaka na wc. <ol style="list-style-type: none">1) U 15h popijte 90 ml kontrastnog sredstva razrijedjenog u čaši vode.2) Oko 17 sati popijte 90 ml kontrastnog sredstva razrijedjenog u čaši vode. <p>Propisano kontrastno sredstvo nije klasični laksativ, ali zbog hiperosmolarnosti može dovesti do tekućih stolica pa zbog toga od početka uzimanja ostanite kod kuće u blizini WC-a.</p> <p>Svakako se dovoljno hidrirajte i popijte barem litru vode nakon što ste konzumirali ukupnu količinu kontrastnog sredstva .</p>	POSTUPAK PRETRAGE Prije pretrage dobit ćete intravenski lijek (hioscinijev butilbromid) koji otpušta grčeve debelog crijeva. Ako bolujete od određenih poremećaja u debelom crijevu, hipertrofije prostate, glaukoma uskog kuta (očni poremećaj) ili određenih mišićnih bolesti (mijastenija gravis) obavijestite osoblje i lijek vam neće biti dan.
	Za stolom za pretragu ing. med radiologije vam uvodi tanki kateter u rektum, koji ispunjava debelo crijevo s CO ₂ (ugljičnim dioksidom). Prvi dio pretrage obavit ćete ležeći na leđima. Zatim ćete se okrenuti na trbuh, a ing. med. radiologije će dodati malu količinu plina i obaviti drugi dio pregleda.
	Ako ste primili hioscinijev butilbromid, možete privremeno imati zamagljen vid, tako da ne možete voziti automobil .
	Nalaz će biti obrađen u roku od 2 dana.



Poliklinika Medikol

INFORMACIJE I UPUTE PACIJENTIMA O MSCT KOLONOGRAFIJI

UP-98/0

Kod dolaska na pregled molimo priložite :

1. Kompletну medicinsku dokumentaciju (nalaze dosadašnjih pretraga, nalaz specijalista, otpusna pisma, raniji slikovni materijal, ako je riječ o kontroli, obavezno zadnji nalaz i slikovni materijal , CD),
2. Ispunjeno Upitnik OB-140/0 kojeg ste dobili uz ovu Obavijest

Ako ne možete doći na pretragu, barem 24 sata unaprijed otkažite zakazani termin na:

e-mail: info@medikol.hr

ili na brojeve telefona : 072 12 12 12